

対象疾患名(がん腫)	悪性リンパ腫(ホジキンリンパ腫)
レジメン名	A+AVD

1クール期間	4週間	総クール数				6クール			
抗癌剤	1日投与量	day1	day15						
ビンブラスチン	6 mg/m ²	○	○						
ドキシソルビシン	25 mg/m ²	○	○						
ダカルバジン	375 mg/m ²	○	○						
ブレンツキシマブ ベドチン	1.2 mg/kg	○	○						

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50ml/B) ヒドロコルチゾンコハク酸エステル注射用(100mg/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 200mg 1瓶	点滴	30分	day1.15
Rp2	生理食塩液(50mL/V) ◆ビンブラスチン注	1瓶 6mg/m ²	点滴	全開	day1.15
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆ドキシソルビシン注	1瓶 25mg/m ²	点滴	全開	day1.15
Rp4	生理食塩液ソフトバッグ(100mL/V) ◆ダカルバジン注 注射用水(100mL/V)[溶解用]	1袋 375mg/m ² 1瓶	点滴	30分	day1.15
Rp5	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	全開	day1.15
Rp6	生理食塩液(100mL/V) ◆ブレンツキシマブベドチン注 注射用水(100mL/V)[溶解用]	1袋 1.2mg/kg 1瓶	点滴	30分	day1.15

注意事項

吐き気予防:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

ドキシソルビシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量上限500mg/m²)

ビンブラスチンによる便秘、末梢神経障害に注意