

対象疾患名(がん腫)	悪性リンパ腫(ホジキンリンパ腫)
レジメン名	ABVD

1クール期間	4週間	総クール数				2~8クール			
抗癌剤	1日投与量	day1	day15						
ビンブラスチン	6 mg/m ²	○	○						
ドキシソルビシン	25 mg/m ²	○	○						
ブレオマイシン	9 mg/m ²	○	○						
ダカルバジン	375 mg/m ²	○	○						

投与スケジュール

ルートキーフ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ヒトコルチゾンコハク酸エステル注射用(100mg/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 100mg 1瓶	点滴	30分	day1.15
Rp2	生理食塩液(50mL/V) ◆ビンブラスチン注	1瓶 6mg/m ²	点滴	全開	day1.15
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆ドキシソルビシン注	1瓶 25mg/m ²	点滴	全開	day1.15
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆ブレオマイシン注	1瓶 9mg/m ²	点滴	60分	day1.15
Rp5	生理食塩液(100mL/V) ◆ダカルバジン注 注射用水(100mL/V)[溶解用]	1瓶 375mg/m ² 1瓶	点滴	30分	day1.15

注意事項

吐き気予防: デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

ドキシソルビシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量上限500mg/m²)

ブレオマイシンによる間質性肺炎注意

ビンブラスチンによる便秘、末梢神経障害に注意