

| | |
|------------|----------|
| 対象疾患名(がん腫) | 骨髄異形成症候群 |
| レジメン名 | AZA |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-------|-----|------|------|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 4週間 | 総クール数 | | | 制限無し | | | | |
| 抗がん剤 | 1日投与量 | day1 | ... | day7 | | | | | |
| アザシチジン | 75 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | | | | | | |

投与スケジュール

| ルートキーフ | | | | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------|------|------|--------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| Rp1 | ◆アザシチジン注射用 注射用水(20mL/V)[溶解用] | 75mg/m ² 1管 | 皮下注射 | | day1~7 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|-------|------|-----|
| | | | |

注意事項

吐き気予防:5HT3受容体拮抗薬の服用

血小板減少に伴う出血:皮下出血、鼻血、歯茎からの出血、血尿、血が止まりにくいなどがあれば報告する

低血圧:めまいや立ちくらみに注意、起立時はゆっくり立ちあがるなどする