

対象疾患名(がん腫)	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(再発・難治)
レジメン名	BR(Benda120:再発難治DLBCL)

1クール期間	3週間	総クール数				最大6クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	day3						
リツキシマブ	375 mg/m ²	○								
ベンダムスチン	120 mg/m ²		○	○						

投与スケジュール

ルートキーブ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ヒドロコルチゾンコハク酸エステル注射用(100mg/V)	1瓶 200mg	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆リツキシマブ注	1袋 375mg/m ²	点滴	速度アップ法で	day1
Rp1	ハロ/セトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B)	1袋	点滴	全開	day2
Rp2	生理食塩液(50mL/V) ◆ベンダムスチン注	1瓶 120mg/m ²	点滴	10分	day2・3

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
アセトアミノフェン クロルフェニラミンマレイン酸塩(点滴の場合あり)	500~1000mg 2~4mg	リツキシマブ開始30分 前	day1

注意事項

リツキシマブ: インフュージョンリアクション注意 前投薬あり