

対象疾患名(がん腫)	悪性リンパ腫
レジメン名	CHOP

1クール期間	3週間	総クール数				6~8クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	day3	day4	day5				
ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○								
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	○								
シクロホスファミド	750 mg/m ²	○								
プレドニゾロン(内服)	100 mg/body	○	○	○	○	○				

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp2	グラニセトン点滴静注液バッグ (3mg/100mL/B)	1袋	点滴	全開	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆ビンクリスチン注	1瓶 1.4mg/m ² (最大量2mg)	点滴	全開	day1
Rp4	生理食塩液(50mL/V) ◆ドキシソルビシン注	1瓶 50mg/m ²	点滴	全開	day1
Rp5	生理食塩液(250mL/B) ◆シクロホスファミド注	1袋 750mg/m ²	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
プレドニゾロン	100mg/body	毎食後	day1~5(5日間)

注意事項

シクロホスファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

ドキシソルビシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量500mg/m²要注意)

ビンクリスチンによる便秘、末梢神経障害に注意