

対象疾患名(がん腫)	悪性リンパ腫
レジメン名	CHOP

1クール期間	3週間	総クール数					6～8クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	day3	day4	day5					
ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○									
ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○									
シクロホスファミド	750 mg/m ²	○									
プレドニゾン(内服)	100 mg/body	○	○	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp2	グラニセトン点滴静注液バッグ (3mg/100mL/B)	1袋	点滴	30分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆ビンクリスチン注	1瓶 1.4mg/m ² (最大量2mg)	点滴	全開	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆ドキシソルピシン注	1瓶 50mg/m ²	点滴	30分	day1
Rp5	生理食塩液(500mL/B) ◆シクロホスファミド注	1袋 750mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
プレドニゾン	100mg/body	毎食後	day1～5(5日間)

注意事項

シクロホスファミドによる出血性膀胱炎予防: 点滴後2～3日間の水分摂取を推奨

ドキシソルピシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量500mg/m²要注意)