

対象疾患名(がん腫)	多発性骨髄腫
レジメン名	DaraVD皮下注(4~8サイクル目)

1クール期間	3週間	総クール数				5クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	day4	day5	day8	day9	day11	day12	
ダラツムマブ	1800 mg/body	○								
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○		○		○		○		
デキサメタゾン(点滴または内服)	20 mg/body	○	○	○	○	○	○	○	○	

投与スケジュール

ルートキープ ※生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1※	生理食塩液(50mL/V) デキサート注射液(6.6mg/V)	1瓶 3瓶	点滴	全開	day1
Rp2	◆ダラキューロ配合皮下注	1800mg/body	皮下注射	3~5分	day1
Rp3	◆ボルテゾミブ注 生理食塩液(5mL/A)[溶解用]	1.3mg/m ² 1管	皮下注射		day1、4、8、11

※デキサメタゾン内服時は点滴なし

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
アセトアミノフェン	900~1000mg	皮下注開始1時間前に	day1
ジフェンヒドラミン	50mg		

注意事項

嘔吐又は下痢による脱水症状の予防:嘔吐や下痢時はこまめな水分や電解質を補給する

浮動性めまい、頭部ふらふら感又は失神発作があらわれた場合には受診する

心障害・肺障害に注意

低血圧によるめまいや立ちくらみ:自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事しないように注意

ダラツムマブ:インフュージョンリアクション注意 前投薬あり