

対象疾患名(がん腫)	濾胞性リンパ腫
レジメン名	GCHOP(G:ガザイバ、2サイクル目以降)

1クール期間	3週間	総クール数					6クール(G:8クール)				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	day3	day4	day5					
オビヌツズマブ	1000 mg/m ²	○									
ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	○									
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	○									
シクロホスファミド	750 mg/m ²	○									
プレドニゾロン(内服)	100 mg/body	○	○	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液ソフトバッグ(250mL/B) ◆オビヌツズマブ注	1袋 1000mg/m ²	点滴	速度アップ法 で	day1
Rp2	グラニセロン点滴静注バッグ(3mg/100mL/B)	1袋	点滴	全開	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆ピンクリスチン注	1瓶 1.4mg/m ² (最大量2mg)	点滴	全開	day1
Rp4	生理食塩液(50mL/V) ◆ドキシソルビシン注	1瓶 50mg/m ²	点滴	全開	day1
Rp5	生理食塩液(250mL/V) ◆シクロホスファミド注	1袋 750mg/m ²	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
アセトアミノフェン クロルフェニラミンマレイン酸塩	500~1000mg 2~4mg	オビヌツズマブ開始60 分前	day1
プレドニゾロン	100mg/body	毎食後	day1~5(5日間)

注意事項

オビヌツズマブ:インフュージョンリアクション注意 前投薬あり

シクロホスファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

ドキシソルビシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量500mg/m²要注意)

ピンクリスチンによる便秘、末梢神経障害に注意