

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助、進行・再発)
レジメン名	EC

1クール期間	3週間	総クール数	術前・術後補助:4クール 進行・再発:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
エピルビン	90 mg/m ²	○							
シクロfosファミド	600 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1.5瓶	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆エピルビン注	50mL 90mg/m ²	点滴	10分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロfosファミド注	1瓶 600mg/m ²	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

好中球減少予防対策:ペグフィルグラスチム翌日以降に皮下注

シクロfosファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

エピルビンによる心毒性の可能性注意(累積投与量900mg/m²要注意)