

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前補助)
レジメン名	Pembro+EC

1クール期間	3週間	総クール数	術前補助:4クール						
抗癌剤	1日投与量	day1							
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○							
エピルビン	90 mg/m ²	○							
シクロフォスファミド	600 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1瓶 200mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1.5瓶	点滴	30分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆エピルビン注	50mL 90mg/m ²	点滴	10分	day1
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロフォスファミド注	1瓶 600mg/m ²	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

好中球減少予防対策:ペグフィルグラスチム皮下注(骨痛・背部痛を自覚することあり)

シクロフォスファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2～3日間の水分摂取を推奨

エピルビンによる心毒性の可能性注意(累積投与量900mg/m²要注意)

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。