

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前補助)
レジメン名	Pembro+PTX+CBDCA

1クール期間	3週間	総クール数			術前補助:4クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○							
パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○					
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1瓶 200mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1.5瓶 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2'	生理食塩液(100mL/B) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day8.15
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1.8.15
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 5mg/GFR+25	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	50mg	開始30分前	day1. 8. 15

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによる末梢神経障害

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。