

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前補助)
レジメン名	Pembro+PTX+wCBDCA

1クール期間	3週間	総クール数			術前補助:4クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ペムブロリズマブ	200 mg/body	○							
パクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○					
カルボプラチン	1.5 mg/GFR+25	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/B) ◆ペムブロリズマブ注	1瓶 200mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	パロノセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1.8.15
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1.8.15
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 1.5mg/GFR+25	点滴	30分	day1.8.15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	50mg	開始30分前	day1. 8. 15

注意事項

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによる末梢神経障害

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。