

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助)
レジメン名	TC(DTX75+CPA600)

1クール期間	3週間	総クール数				4クール			
抗癌剤	1日投与量	day1							
ドセタキセル	75 mg/m ²	○							
シクロfosファミド	600 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	グラニセロン点滴静注液バッグ (3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1.5瓶	点滴	15分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロfosファミド注	1袋 600mg/m ²	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

吐き気予防対策: デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

好中球減少予防対策: ペグフィルグラスチム翌日以降に皮下注(骨痛・背部痛を自覚することあり)

シクロfosファミドによる出血性膀胱炎予防: 点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

皮疹にはヘパリン類似物質、関節・筋肉痛にはNSAIDs、末梢神経障害に漢方など