

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助)
レジメン名	TC(DTX75+CPA600)

1クール期間	3週間	総クール数				4クール			
抗癌剤	1日投与量	day1							
ドセタキセル	75 mg/m ²	○							
シクロfosファミド [*]	600 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキーブ [°] 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	グラニセロン点滴静注液バッグ [°] (3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1.5瓶	点滴	15分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロfosファミド [*] 注	1袋 600mg/m ²	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策: デキサメタゾンの服用

好中球減少予防対策: ペグフィルグラスチム翌日以降に皮下注(骨痛・背部痛を自覚することあり)

シクロfosファミドによる出血性膀胱炎予防: 点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

皮疹にはヘパリン類似物質、関節・筋肉痛にはNSAIDs、末梢神経障害に漢方など