

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助、進行・再発)
レジメン名	TC+H+P

1クール期間	3週間	総クール数	術前・術後補助:4クール(H+Pはtotalで1年) 進行・再発:規定なし							
抗癌剤	1日投与量	day1								
初回										
ペルツズマブ	840 mg/body	○								
トラスツズマブ	8 mg/kg	○								
ドセタキセル	75 mg/m ²	○								
シクロホスファミド	600 mg/m ²	○								
2回目以降										
ペルツズマブ	420 mg/body	○								
トラスツズマブ	6 mg/kg	○								
ドセタキセル	75 mg/m ²	○								
シクロホスファミド	600 mg/m ²	○								

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ペルツズマブ注	1袋 840mg/body	点滴	60分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 8mg/kg 2瓶	点滴	90分	day1
Rp3	グラニセロン点滴静注液ハック(3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 2瓶	点滴	15分	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp5	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロホスファミド注	1袋 600mg/m ²	点滴	30分	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ペルツズマブ注	1袋 420mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆トラスツズマブ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 6mg/kg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	グラニセロン点滴静注液ハック(3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 2瓶	点滴	15分	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp5	生理食塩液(100mL/V) ◆シクロホスファミド注	1袋 600mg/m ²	点滴	30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用

シクロホスファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2～3日間の水分摂取を推奨

トラスツズマブによる心機能の低下:労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意

ペルツズマブによる下痢に注意

初回のみ:インフュージョンリアクション予防にアセトアミノフェン内服

好中球減少予防対策:ペグフィルグラスチム皮下注(骨痛・背部痛を自覚することあり)