対象疾患名（がん腫）	乳がん（術前・術後補助）
レジメン名	TCbH+PERJETA

1クール期間	3週間	総クール数			術前・術後補助：4クール（H+Pはtotalで1年） 進行・再発：規定なし					
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15						
初回										
ペルツズマブ	840 mg／body	○								
トラスツズマブ	8 mg／kg	○								
ドセタキセル	75 mg／㎡	○								
カルボプラチン	6 mg／GFR+25	○								
2回目以降										
ペルツズマブ	420 mg／body	○								
トラスツズマブ	6 mg／kg	○								
ドセタキセル	75 mg／㎡	○								
カルボプラチン	6 mg／GFR+25	○								

投与スケジュール

ルートキープ　　生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ注	1袋 840mg/body	点滴	60分	day1
Rp2	生理食塩液（250mL/B） ◆ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 8mg/kg 2瓶	点滴	90分	day1
Rp3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ（0.75mg/50mL/B） ﾎｽﾈﾂﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注(235mg/10mL/V) ﾃﾞｷｻﾒﾀﾞｿﾞﾝ注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1.5瓶	点滴	30分	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ注	1袋 75mg/㎡	点滴	60分	day1
Rp5	5%ブドウ糖注射液（250mL/B） ◆ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注	1袋 6mg/GFR+25	点滴	30分	day1
Rp6	生理食塩液（50mL/V）	1瓶	点滴	フラッシュ	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ注	1袋 420mg/body	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液（250mL/B） ◆ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ注 注射用水(20mL/A)	1瓶 6mg/kg 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ（0.75mg/50mL/B） ﾎｽﾈﾂﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注(235mg/10mL/V) ﾃﾞｷｻﾒﾀﾞｿﾞﾝ注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1.5瓶	点滴	30分	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ注	1袋 75mg/㎡	点滴	60分	day1
Rp5	5%ブドウ糖注射液（250mL/B） ◆ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注	1袋 6mg/GFR+25	点滴	30分	day1
Rp6	生理食塩液（50mL/V）	1瓶	点滴	フラッシュ	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防：（デキサメタゾン）の服用　※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

トラスツズマブによる心機能の低下：労作時息切れ、体重増加（浮腫）などに注意

ペルツズマブによる下痢に注意

好中球減少予防対策：ペグフィルグラスチム皮下注（骨痛・背部痛を自覚することあり）

初回のみ：インフュージョンリアクション予防にアセトアミノフェン内服