

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助、進行・再発)
レジメン名	フェスコIN・MA+DTX

1クール期間	3週間	総クール数	術前術後:合計1年間(DTXは4回) 進行・再発:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
初回									
ペルツズマブ	1200 mg/body	○							
トラスツズマブ	600 mg/body	○							
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	○							
2回目以後									
ペルツズマブ	600 mg/body	○							
トラスツズマブ	600 mg/body	○							
ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	◆フェスコ配合皮下注IN	P:1200mg/body T:600mg/body	皮下注射	8分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1
2回目以後					
Rp1	◆フェスコ配合皮下注MA	P:600mg/body T:600mg/body	皮下注射	5分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1瓶	点滴	15分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆ドセタキセル注	1袋 75mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

トラスツズマブによる心機能の低下:労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意

ペルツズマブによる下痢に注意

初回のみ:インフュージョンリアクション予防にアセトアミノフェン内服(点滴からの移行では不要)