

| | |
|------------|---------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 乳がん(術前・術後補助) |
| レジメン名 | フェスコIN・MA+PTX |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|-------|----------------|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 3週間 | 総クール数 | | | 合計1年間(PTXは12回) | | | | |
| 抗癌剤 | 1日投与量 | day1 | day8 | day15 | | | | | |
| 初回 | | | | | | | | | |
| ペルツズマブ | 1200 mg/body | ○ | | | | | | | |
| トラスツズマブ | 600 mg/body | ○ | | | | | | | |
| パクリタキセル | 80 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 2回目以後 | | | | | | | | | |
| ペルツズマブ | 600 mg/body | ○ | | | | | | | |
| トラスツズマブ | 600 mg/body | ○ | | | | | | | |
| パクリタキセル | 80 mg/m ² | ○ | ○ | ○ | | | | | |

投与スケジュール

| ルートキー [°] 生理食塩液100mL | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------|------|-----------|
| 順番 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| 初回 | | | | | |
| Rp1 | ◆フェスコ [°] 配合皮下注IN | P:1200mg/body T:600mg/body | 皮下注射 | 8分 | day1 |
| Rp2 | 生理食塩液(100mLV) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) | 1瓶 1管 1瓶 | 点滴 | 30分 | day1、8、15 |
| Rp3 | 生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注 | 1袋 80mg/m ² | 点滴 | 60分 | day1、8、15 |
| 2回目以後 | | | | | |
| Rp1 | ◆フェスコ [°] 配合皮下注MA | P:600mg/body T:600mg/body | 皮下注射 | 5分 | day1 |
| Rp2 | 生理食塩液(100mLV) ファモチジン注射液(20mg/2mL/A) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) | 1瓶 1管 1瓶 | 点滴 | 30分 | day1、8、15 |
| Rp3 | 生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注 | 1袋 80mg/m ² | 点滴 | 60分 | day1、8、15 |

内服

| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----------|-------|--------|-----------|
| ジフェンヒドラミン | 50mg | 開始30分前 | day1、8、15 |

注意事項

トラスツズマブによる心機能の低下: 労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意

ペルツズマブによる下痢に注意

初回のみ: インフュージョンリアクション予防にアセトアミノフェン内服(点滴からの移行では不要)

パクリタキセルによるアレルギー予防: 点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有: 治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによる末梢神経障害