

対象疾患名(がん腫)	乳癌(手術不能または再発)
レジメン名	weeklyPTX+BV

1クール期間	4週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○					
ベバシズマブ	10 mg/kg	○		○					

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(50mL/V) フアモチジン注射液(20mg/2mL/A) テキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1瓶 1管 1瓶	点滴	30分	day1.8.15
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆パクリタキセル注	1袋 80mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1.8.15
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 10mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1.15
Rp4	生理食塩液(50mL/V)(フラッシュ用)	1瓶	点滴	全開	day1.15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ジフェンヒドラミン	50mg	開始30分前	day1,8,15

注意事項1

パクリタキセルによるアレルギー予防:点滴前に服用するためにジフェンヒドラミン50mg処方

パクリタキセルにアルコール含有:治療後、車の運転禁止(当日)

パクリタキセルによる末梢神経障害

ベバシズマブに特徴的な副作用、出血、創傷治癒遅延、高血圧など。