

対象疾患名(がん腫)	非小細胞肺癌(進行・再発)
レジメン名	CBDCA+nab-PTX+ペムプロリスマブ

1クール期間	3週間	総クール数			規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
ペムプロリスマブ	200 mg/body	○							
nab-パクリタキセル	100 mg/m ²	○	○	○					
カルボプラチン	6 mg/GFR+25	○							

投与スケジュール

ルートキー		生理食塩液100mL						
順番 day1	順番 day8、 15	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日		
Rp1		生理食塩液(100mL/B) ◆ペムプロリスマブ注	1袋 200mg/body	点滴	30分	day1		
Rp2		ハロノセロン点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1		
	Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day8、15		
Rp3	Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆nab-パクリタキセル注	1瓶 100mg/m ²	点滴	30分	day1、8、15		
Rp4		5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 6mg/GFR+25	点滴	30分	day1		

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾン)の服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。