

対象疾患名(がん腫)	非小細胞肺癌(進行・再発)
レジメン名	CBDCA+nab-PTX+ペムプロリスマブ

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15						
ペムプロリスマブ	200 mg/body	○								
nab-パクリタキセル	100 mg/m ²	○	○	○						
カルボプラチン	5 mg/GFR+25	○								

投与スケジュール

ルートキー		生理食塩液100mL								
順番 day1	順番 day8、 15	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日				
Rp1		生理食塩液(100mL/B) ◆ペムプロリスマブ注	1袋 200mg/body	点滴	30分	day1				
Rp2		パロセトロン点滴静注パック(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1				
	Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day8、15				
Rp3	Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆nab-パクリタキセル注	1瓶 100mg/m ²	点滴	30分	day1、8、15				
Rp4		5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆カルボプラチン注	1袋 6mg/GFR+25	点滴	30分	day1				

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

吐き気予防対策: デキサメタゾン(+アプレピタント)

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。