

対象疾患名(がん腫)	肺癌(術後補助、進行・再発)
レジメン名	CDDP+VNR shorthydration(mannitolなし)

1クール期間	3週間	総クール数			術後補助:4クール 進行・再発:規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8						
シスプラチン	80 mg/m ²	○							
ビノレルビン	25 mg/m ²	○	○						

投与スケジュール

ルートキーフ 生理食塩液100mL						
順番 day1	順番 day8	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1		パロノセトロン点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1.5瓶	点滴	30分	day1
Rp2		生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	全開で	day1
Rp3		KN3号輸液(500mL/B) 硫酸Mg補正液(20mEq/20mL/A)	1袋 0.5管	点滴	60分	day1
Rp4	Rp1	生理食塩液(50mL/V) ◆ビノレルビン注	1瓶 25mg/m ²	点滴	全開で	day1、8
Rp5		生理食塩液(250mL/B) ◆シスプラチン注	1袋 80mg/m ²	点滴	60分	day1
Rp6		フロセド注(20mg/2mL/A) 生理食塩液(50mL/V)	1管 1瓶	点滴	全開で	day1
Rp7		KN3号輸液(500mL/B)	1袋	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾン)の服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある
シスプラチンによる腎障害予防:水分摂取の奨励(1日1L)、乏尿になれば受診を