

対象疾患名(がん腫)	卵巣がん(進行・再発)
レジメン名	CPT-11(100mg/m ²)(3投1休)

1クール期間	4週間	総クール数			制限なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8	day15					
イリノテカン	100 mg/m ²	○	○	○					

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロノセトン点滴静注液バッグ (0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1,8,15
Rp2	生理食塩液ソフトバッグ(500mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 100mg/m ²	点滴	90分	day1,8,15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

CPT-11:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時の乳酸菌製品の摂取注意