

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	CAPOX+BEV

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし					
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14						
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	○									
オキサリプラチン	130 mg/m ²	○									
カペシタビン(内服)	下記記載あり	○	○	...	○						

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL						
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1	
Rp2	パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1	
Rp3	5%ブドウ糖注射液ソフトバッグ(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 130mg/m ²	点滴	120分	day1	

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ゼローダ300mg	下記参照*	朝夕食後(30分以内に服用)	day1~14

* 1.36m²未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
1.36m²以上1.66m²未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
1.66m²以上1.96m²未満 : 1800mg/回(3600mg/日)
1.96m²以上 : 2100mg/回(4200mg/日)

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾン)の服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

カペシタビンによる手足症候群の予防:保湿・保清・保護

服薬日誌の利用を推奨

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨