

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	CET

1クール期間	1週間	総クール数	規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
初回									
セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	○							
2回目以後									
セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup>	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋(total300mL) 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V)	1瓶	点滴	60分	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	200mL 250mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

皮膚障害予防セット(抗生物質約6週間内服+ヘパリン類似物質外用+顔・体・頭用ステロイド外用)

セツキシマブによる皮膚障害の予防:保湿・保清・保護