

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	CPT-11+PANI

1クール期間	2週間	総クール数	再発・進行:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
パニツムマブ	6 mg/kg	○							
イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V) d-クロルフェニラミンマレイン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆パニツムマブ注	1袋 6mg/kg	点滴	60分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	フラッシュ 5分で	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾンの服用) ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

イリノテカンによる相互作用:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制。下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

皮膚障害予防セット(抗生物質約6週間内服+ヘパリン類似物質外用+顔・体・頭用ステロイド外用)

パニツムマブによる皮膚障害の予防:保湿・保清・保護