

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	Cape+BEV

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14					
ペバシズマブ	7.5 mg/kg	○								
カペシタビン(内服)	下記記載あり mg/m ²	○	○	...	○					

投与スケジュール

ルートキープ ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ペバシズマブ注	1瓶 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
Rp2					

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ゼローダ300mg	下記参照※	朝夕食後(30分以内に服用)	day1~14

※1.36m²未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
 1.36m²以上1.66m²未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
 1.66m²以上1.96m²未満 : 1800mg/回(3600mg/日)
 1.96m²以上 : 2100mg/回(4200mg/日)

注意事項

カペシタビンによる手足症候群の予防: 保湿・保清・保護

服薬日誌の利用を推奨

ペバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨