

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	ENCO+BINI+CET

1クール期間	1週	総クール数				規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day7					
初回										
セツキシマブ	400 mg/m ²	○								
エンコラフェニブ	300 mg/body	○	○	...	○					
ビニメチニブ	90 mg/body	○	○	...	○					
2回目以後										
セツキシマブ	250 mg/m ²	○								
エンコラフェニブ	300 mg/body	○	○	...	○					
ビニメチニブ	90 mg/body	○	○	...	○					

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
初回					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミンマレイン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	1袋 400mg/m ²	点滴	120分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	60分	day1
2回目以後					
Rp1	生理食塩液(100mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミンマレイン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆セツキシマブ注	200mL 250mg/m ²	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ビラフトビカプセル75mg、50mg	300mg	1日1回	連日投与
メクトビ錠15mg	90mg(45mg×2)	1日2回	連日投与

注意事項

皮膚障害予防セット(抗生物質約6週間内服+ヘパリン類似物質外用+顔・体・頭用ステロイド外用)

エンコラフェニブ、セツキシマブによる皮膚障害の予防:保湿・保清・保護

エンコラフェニブ:皮膚の異常が現れた場合には速やかに医療機関を受診すること

エンコラフェニブ・ビニメチニブによる眼症状:

視力が落ちる、まぶしく感じる、虫が飛んでるように見えるなど見え方に注意

ビニメチニブによる心機能の低下:労作時息切れ、体重増加(浮腫)などに注意