

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	FOLFIRI

1クール期間	2週間	総クール数	再発・進行:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	○							
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○							
5FU(急速静注)	400 mg/m <sup>2</sup>	○							
5FU(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>	○(46時間持続)							

投与スケジュール

ルートキー <sup>o</sup> 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1
Rp2'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	day1
Rp4	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m <sup>2</sup>	静脈内局所持続注入(シユア フューサー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防: アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける