

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	FOLFIRI

1クール期間	2週	総クール数	再発・進行:規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1				
イリノテカン	150 mg/m ²	○				
レボホリナート	200 mg/m ²	○				
5FU(急速静注)	400 mg/m ²	○				
5FU(持続静注)	2400 mg/m ²	○(46時間持続)				

投与スケジュール

ルートキー		生理食塩液100mL				
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
Rp1	パロセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1	
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m ²	点滴	90分	day1	
Rp2'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m ²	点滴	120分	day1	
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 400mg/m ²	点滴	全開	day1	
Rp4	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注(1万単位/10mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m ²	静脈内局所持続注入(シュア フューザー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)	

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾン)の服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

イリノテカンによる相互作用:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制。下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける