

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)二次治療以降
レジメン名	FOLFIRI+RAM

1クール期間	2週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1							
ラムシルマブ	8 mg/kg	○							
イリノテカン	150 mg/m ²	○							
レボホリナート	200 mg/m ²	○							
5FU(急速静注)	400 mg/m ²	○							
5FU(持続静注)	2400 mg/m ²	○(46時間持続)							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロセットロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) d-クロルフェニラミン酸注(5mg/1mL/A)	1袋 1瓶 1管	点滴	15分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆ラムシルマブ注	1瓶 8mg/kg	点滴	60分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1袋	点滴	フラッシュ 15分で	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m ²	点滴	90分	day1
Rp4'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m ²	点滴	2時間	day1
Rp5	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 400mg/m ²	点滴	全開	day1
Rp6	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m ²	静脈内局所持 続注入(シュア フューザー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

注意事項

吐き気予防: アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり) □

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

ラムシルマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨