

|            |                |
|------------|----------------|
| 対象疾患名(がん腫) | 大腸・直腸がん(進行・再発) |
| レジメン名      | S-1+BEV        |

|        |           |       |      |     |       |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------|------|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 1クール期間 | 3週間       | 総クール数 |      |     |       |  |  |  |  |  |
| 抗癌剤    | 1日投与量     | day1  | day2 | ... | day14 |  |  |  |  |  |
| ベバシズマブ | 7.5 mg/kg | ○     |      |     |       |  |  |  |  |  |
| S1(内服) | 下記記載あり    | ○     | ○    | ... | ○     |  |  |  |  |  |

#### 投与スケジュール

| ルートキープ 生理食塩液100ml |                            |                |      |                             |      |
|-------------------|----------------------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| 順番                | 薬剤名                        | 1日投与量          | 投与方法 | 投与時間                        | 投与日  |
| Rp1               | 生理食塩液(100mL/V)<br>◆ベバシズマブ注 | 1瓶<br>7.5mg/kg | 点滴   | 初回90分<br>2回目60分<br>3回目以降30分 | day1 |

#### 内服

| 薬剤名                    | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日     |
|------------------------|-------|------|---------|
| エスワンタイホウ配合OD錠20mg・25mg | 下記参照* | 朝夕食後 | day1~14 |

\* 体表面積 1.25㎡未満 40mg/回(80mg/日)  
1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回(100mg/日)  
1.5㎡以上 60mg/回(120mg/日)  
腎機能による減量あり

#### 注意事項

S1による流涙の予防:人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨

ベバシズマブ:出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける