

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	SIRB療法

1クール期間	3週間	総クール数	規定なし
抗癌剤	1日投与量	day1	
ペバシズマブ	7.5 mg/kg	○	
イリノテカン	150 mg/m ²	○	
S1(内服)	下記記載あり mg/body	○	

投与スケジュール

ルートキー ^o	生理食塩液100mL				
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ペバシズマブ注	1瓶 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
Rp2	ハロ/セロン点滴静注バッグ (0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 150mg/m ²	点滴	90分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠20mg・25mg	下記参照※	朝・夕食後	day1～14

※体表面積 1.25m²未満 : 40mg/回(80mg/日)
1.25m²以上1.5m²未満 : 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 : 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量あり

注意事項

吐き気予防: デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)〔

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

S1による流涙の予防: 人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

ペバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

服薬日誌の利用を推奨