

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	SOX100 or 130

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
オキサリプラチン	100 or 130 mg/m ²	○							
S1(内服)	下記記載あり	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキーブ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 100 or 130mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワンタイホウ配合OD錠T20mg・25mg	下記参照*	朝夕食後	day1~14

* 体表面積 1.25m²未満 40mg/回(80mg/日)
1.25m²以上1.5m²未満 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量あり

注意事項

吐き気予防:(デキサメタゾン)の服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

S1による流涙の予防:人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

服薬日誌の利用を推奨