

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	SOX100 or 130

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14					
オキサリプラチン	100 or 130 mg/m ²	○								
S1(内服)	下記記載あり mg/body	○	○	...	○					

投与スケジュール

ルートキーブ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	(SOX100) グラニセロン点滴静注液バッグ(3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
	(SOX130) パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶		15分	
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 100 or 130mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠20mg・25mg	下記参照※	朝夕	day1~14

※体表面積 1.25m²未満 : 40mg/回(80mg/日)
1.25m²以上1.5m²未満 : 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 : 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量あり

注意事項

吐き気予防: アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防: 点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

S1による流涙の予防: 人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

服薬日誌の利用を推奨