

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)二次治療以降
レジメン名	TAS-102+BEV

1クール期間	4週間	総クール数								
抗癌剤	1日投与量	day1	...	day5	day6・7	day8	...	day12	day13・14	day15
ベバシズマブ	5 mg/kg	○								○
トリフルリジン・チピラシル(内服)	下記記載あり	○	...	○		○	...	○		

投与スケジュール

ルートキーフ ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1、15

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ロンサーフ配合錠T15mg・20mg	下記参照*	朝夕食後	day1~5、8~12

* 体表面積 1.07㎡未満	35mg/回(70mg/日)
1.07㎡以上~1.23㎡未満	40mg/回(80mg/日)
1.23㎡以上~1.38㎡未満	45mg/回(90mg/日)
1.38㎡以上~1.53㎡未満	50mg/回(100mg/日)
1.53㎡以上~1.69㎡未満	55mg/回(110mg/日)
1.69㎡以上~1.84㎡未満	60mg/回(120mg/日)
1.84㎡以上~1.99㎡未満	65mg/回(130mg/日)
1.99㎡以上~2.15㎡未満	70mg/回(140mg/日)
2.15㎡以上	75mg/回(150mg/日)

注意事項

休薬期間(服用スケジュール)注意

専用シートを利用して、服薬間違いの防止を推奨

服薬日誌の利用を推奨

ベバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

ベバシズマブ: 出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける