

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	XELIRI+BEV

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
ペバシズマブ	7.5 mg/kg	○							
イリノテカン	200 mg/m ²	○							
カペシタビン(内服)	下記記載あり mg/m ²	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ペバシズマブ注	1瓶 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
Rp2	ハロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液ソフトバッグ(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 200mg/m ²	点滴	90分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ゼローダ300mg	下記参照※	朝夕食後(30分以内に服用)	day1~14

※1.31m²未満 : 900mg/回(1800mg/日)
 1.31m²以上1.69m²未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
 1.69m²以上2.07m²未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
 2.07m²以上 : 1800mg/回(3600mg/日)

注意事項

吐き気予防: デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり) □
 セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

カペシタビンによる手足症候群の予防: 保湿

ペバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

服薬日誌の利用を推奨