

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発、術後補助)
レジメン名	XELOX

1クール期間	3週間	総クール数				術後補助療法:6ヶ月 再発・進行:規定なし				
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14					
オキサリプラチン	130 mg/m ²	○								
カペシタビン(内服)	下記記載あり mg/m ²	○	○	...	○					

投与スケジュール

ルートキーブ 生理食塩液100ml					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	グラニセロン点滴静注液バッグ (3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液ソフトバッグ(250mL/B) ◆オキサリプラチン注(100mg/20mL/V)	1袋 130mg/m ²	点滴	120分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ゼローダ300mg	下記参照※	朝夕食後(30分以内に服用)	day1~14

※1.36m²未満 : 1200mg/回(2400mg/日)
1.36m²以上1.66m²未満 : 1500mg/回(3000mg/日)
1.66m²以上1.96m²未満 : 1800mg/回(3600mg/日)
1.96m²以上 : 2100mg/回(4200mg/日)

注意事項

吐き気予防:アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

カペシタビンによる手足症候群の予防:保湿・保清・保護

服薬日誌の利用を推奨