

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発)
レジメン名	XELOX+BEV

1クール期間	3週間	総クール数				規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day14				
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	○							
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	○							
カペシタビン(内服)	下記記載あり mg/m <sup>2</sup>	○	○	...	○				

#### 投与スケジュール

ルートキー <sup>o</sup> 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 7.5mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
Rp2	グラニセロン点滴静注液バッグ <sup>o</sup> (3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液ソフトバッグ <sup>o</sup> (250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 130mg/m <sup>2</sup>	点滴	120分	day1

#### 内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
ゼローダ300mg	下記参照※	朝夕食後(30分以内 に服用)	day1~14

※1.36m<sup>2</sup>未満 :1200mg/回(2400mg/日)  
1.36m<sup>2</sup>以上1.66m<sup>2</sup>未満 :1500mg/回(3000mg/日)  
1.66m<sup>2</sup>以上1.96m<sup>2</sup>未満 :1800mg/回(3600mg/日)  
1.96m<sup>2</sup>以上 :2100mg/回(4200mg/日)

#### 注意事項

吐き気予防:アプレピタント(+デキサメタゾン)の服用

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避

カペシタビンによる手足症候群の予防:保湿・保清・保護

ベバシズマブによる高血圧管理:家庭血圧の測定・記録を推奨

服薬日誌の利用を推奨