

対象疾患名(がん腫)	大腸・直腸がん(進行・再発、術後補助)
レジメン名	sLV5-FU2

1クール期間	2週間	総クール数	術後補助療法:6ヶ月 再発・進行:規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1				
レボホリナート	200 mg/m ²	○				
5FU(急速静注)	400 mg/m ²	○				
5FU(持続静注)	2400 mg/m ²	○(46時間持続)				

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m ²	点滴	2時間	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 400mg/m ²	点滴	全開	day1
Rp4	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m ²	静脈内局所持 続注入(シユア フューサー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日