

対象疾患名(がん腫)	胆道がん(進行・再発)
レジメン名	Durva+GC

1クール期間	3週間	総クール数			8クール				
抗癌剤	1日投与量	day1	day8						
デュルバルマブ	1500 mg/body	○							
GEM	1000 mg/m ²	○	○						
CDDP	25 mg/m ²	○	○						

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
RP1	生理食塩液(100mL/V) デュルバルマブ	1袋 1500mg	点滴(側管)	60分	day1
Rp1'	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp2'	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp3'	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp2	パロセトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) 硫酸Mg補正液(20mEq/20mL/A)	1袋 1瓶 0.5瓶	点滴(側管)	30分	day1,8
Rp3	生理食塩液(250mL/B) ◆シスプラチン注	1袋 25mg/m ²	点滴(側管)	60分	day1,8
Rp4	生理食塩液(100mL/V) ◆ゲムシタピン注	1瓶 1000mg/m ²	点滴(側管)	30分	day1,8
Rp5	マンニトールS注射液(300mL/B)	1袋	点滴(側管)	60分	day1,8

注意事項

吐き気予防:デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

シスプラチンによる腎障害予防:水分摂取の奨励(1日1L)、乏尿になれば受診を

irAEの早期発見:血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。