

対象疾患名(がん腫)	乳がん(術前・術後補助)
レジメン名	FEC100

1クール期間	3週間	総クール数	3~4クール						
抗癌剤	1日投与量	day1							
エピルビシン	100 mg/m ²	○							
シクロfosファミド*	500 mg/m ²	○							
5FU	500 mg/m ²	○							

投与スケジュール

ルートキープ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロ/セロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆エピルビシン注	50mL 100mg/m ²	点滴	10分	day1
Rp3	生理食塩液(500mL/B) ◆シクロfosファミド*注 ◆フルオウラシル注	1袋 500mg/m ² 500mg/m ²	点滴	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項1

吐き気予防対策:アプレピタント+デキサメタゾン

好中球減少予防対策:ペグフィルグラスチム翌日以降に皮下注(骨痛・背部痛を自覚することあり)

シクロfosファミドによる出血性膀胱炎予防:点滴後2~3日間の水分摂取を推奨

エピルビシンによる心毒性の可能性注意(累積投与量900mg/m²要注意)