

対象疾患名(がん腫)	膵臓がん(進行・再発)
レジメン名	FOLFIRINOX

1クール期間	2週	総クール数	制限なし
抗癌剤	1日投与量	day1	
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○	
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○	
イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	○	
5FU(急速静注)	400 mg/m <sup>2</sup>	○	
5FU(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>	○(46時間持続)	

投与スケジュール

ルートキー <sup>o</sup> 生理食塩液100ml					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	パロ/セトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1. 5瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1
Rp3'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 180mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1
Rp4	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	day1
Rp5	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m <sup>2</sup>	静脈内局所持続注入(シュア フューザー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアブレピタント内服を使用することもある  
イリノテカンによる相互作用:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)  
セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)  
下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける  
オキサリプラチンによる寒冷刺激予防:点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避