

対象疾患名(がん腫)	膵臓がん(進行・再発)
レジメン名	FOLFIRINOX

1クール期間	2週	総クール数	制限なし			
抗癌剤	1日投与量	day1				
オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○				
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○				
イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	○				
5FU(急速静注)	400 mg/m <sup>2</sup>	○				
5FU(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>	○(46時間持続)				

投与スケジュール

ルートキー <sup>o</sup> 生理食塩液100ml					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	ハロ/セトン点滴静注/バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1.5瓶	点滴	15分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆オキサリプラチン注	1袋 85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1
Rp3	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1
Rp3'	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 180mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1
Rp4	生理食塩液(50mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 400mg/m <sup>2</sup>	点滴	全開	day1
Rp5	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注N(1万単位/10mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m <sup>2</sup>	静脈内局所持続注入(シェア フューサー)	約46時間 (2mL/H)	day1(～3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防: デキサメタゾン+アプレピタントの服用

イリノテカンによる相互作用: グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける

オキサリプラチンによる寒冷刺激予防: 点滴後1週間は冷たいものの接触や経口摂取を出来るだけ回避