

対象疾患名(がん腫)	胆道がん(進行・再発)
レジメン名	GEM+CDDP+S1(GCS)

1クール期間	2週間	総クール数				制限なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day7				
GEM	1000 mg/m ²	○							
CDDP	25 mg/m ²	○							
S1(内服)	下記記載あり	○	○	...	○				

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100ml					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1
Rp2	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1
Rp3	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1
Rp1	ハロ/セトン点滴静注/バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) 硫酸Mg補正液(20mEq/20mL/A)	1袋 瓶 0.5瓶	1 点滴(側管)	30分	day1
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆シスプラチン注	1袋 25mg/m ²	点滴(側管)	60分	day1
Rp3	生理食塩液(100mL/V) ◆ゲムシタビン注	1瓶 mg/m ²	1000 点滴(側管)	30分	day1
Rp4	マンニトールS注射液(300mL/B)	1袋	点滴(側管)	60分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠 20mg・25mg	下記参照*	朝・夕食後	day1～7

* 体表面積 1.25m²未満 : 40mg/回(80mg/日)
1.25m²以上1.5m²未満 : 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 : 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量あり

注意事項

吐き気予防: デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

シスプラチンによる腎障害予防: 水分摂取の奨励(1日1L)、乏尿になれば受診を

S1による流涙の予防: 人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

服薬日誌の利用を推奨