

対象疾患名(がん腫)	胆道がん(進行・再発)
レジメン名	GEM+CDDP

1クール期間	3週間	総クール数				制限なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day8						
ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○						
シスプラチン	25 mg/m ²	○	○						

投与スケジュール

ルートキー [°] 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp2	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp3	生理食塩液(500mL/B)	1袋	点滴(メイン)	1時間	day1,8
Rp1	パロ/セトン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V) 硫酸Mg補正液(20mEq/20mL/A)	1袋 1瓶 0.5瓶	点滴(側管)	30分	day1,8
Rp2	生理食塩液(250mL/B) ◆シスプラチン注	1袋 25mg/m ²	点滴(側管)	60分	day1,8
Rp3	生理食塩液(100ml/V) ◆ゲムシタピン注	1瓶 1000mg/m ²	点滴(側管)	30分	day1,8
Rp4	マンニトールS注射液(300mL/B)	1袋	点滴(側管)	60分	day1,8

注意事項

吐き気予防:デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

シスプラチンによる腎障害予防:水分摂取の奨励(1日1L)、乏尿になれば受診を