

対象疾患名(がん腫)	胆道がん/膵がん(術後補助・進行・再発)
レジメン名	GEM+S1(GS)

1クール期間	4週間 (※隔週、3週の場合あり)	総クール数				術後補助:6ヶ月 進行・再発:制限なし			
抗癌剤	1日投与量	day1	day2	...	day8	...	day14		
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	○			○				
S1(内服)	下記記載あり	○	○	...	○	...	○		

投与スケジュール

ルートキーフ 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(50mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	15分	day1、8
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆ゲムシタビン注	1瓶 1000mg/m ²	点滴	30分	day1、8

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日
エスワン配合錠 20mg・25mg	下記参照※	朝・夕食後	day1~14

※体表面積 1.25m²未満 : 40mg/回(80mg/日)
1.25m²以上1.5m²未満 : 50mg/回(100mg/日)
1.5m²以上 : 60mg/回(120mg/日)
腎機能による減量あり

注意事項

S1による流涙の予防:人工涙液(防腐剤なし)の購入および使用を推奨

服薬日誌の利用を推奨