

対象疾患名(がん腫)	肝細胞がん(進行)
レジメン名	アテゾリズマブ+ベバシズマブ

1クール期間	3週間	総クール数	再発・進行:規定なし						
抗癌剤	1日投与量	day1							
アテゾリズマブ	1200 mg/body	○							
ベバシズマブ	15 mg/kg	○							

投与スケジュール

ルートキー ^o 生理食塩液100mL					
順番	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
Rp1	生理食塩液(250mL/B) ◆アテゾリズマブ注	1袋 1200mg	点滴	初回60分 2回目以降30分	day1
Rp2	生理食塩液(100mL/V) ◆ベバシズマブ注	1瓶 15mg/kg	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

irAEの早期発見: 血便や粘液便、ひどい倦怠感、急な口渇・多飲多尿、空咳・息切れなど重大な副作用の徴候があれば市立豊中病院に受診する。

ベバシズマブによる高血圧管理: 家庭血圧の測定・記録を推奨

ベバシズマブ: 出血、創傷治癒遅延、高血圧など。抜歯、手術は間隔をあける