

対象疾患名(がん腫)	膵臓がん(進行・再発)
レジメン名	オニバイド+5FU/LV

1クール期間	2週間	総クール数				再発・進行:規定なし			
抗癌剤	1日投与量	day1							
リポソーマルイリノテカン	70 mg/m <sup>2</sup>	○							
レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○							
5FU(持続静注)	2400 mg/m <sup>2</sup>	○(46時間持続)							

投与スケジュール

ルート	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ルートキープ	生理食塩液100mL				
Rp1	グラニセロン点滴静注液バッグ(3mg/100mL/B) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2mL/V)	1袋 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(500mL/B) ◆イリノテカン注	1袋 70mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	フラッシュ 15分で	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	day1
Rp5	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注(1万単位/10mL/V) ◆フルオウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m <sup>2</sup>	静脈内局所持 続注入(シュア フューザー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防:デキサメタゾン(+アプレピタント)の服用

イリノテカンによる相互作用:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける