

対象疾患名(がん腫)	膵臓がん(進行・再発)
レジメン名	オニバイド+5FU/LV

1クール期間	2週間	総クール数	再発・進行:規定なし
抗癌剤	1日投与量	day1	
リポソームイリノテカン	70 mg/m ²	○	
レボホリナート	200 mg/m ²	○	
5FU(持続静注)	2400 mg/m ²	○(46時間持続)	

投与スケジュール

ルート	薬名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ルートキープ	生理食塩液100mL				
Rp1	ハロノセロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL/B) ホスネツピタント点滴静注(235mg/10mL/V) デキサメタゾン注射液(6.6mg/2m/V)	1袋 1瓶 1瓶	点滴	30分	day1
Rp2	5%ブドウ糖注射液(500mL/B) ◆イリノテカン注(リポソーム製剤)	1袋 70mg/m ²	点滴	90分	day1
Rp3	生理食塩液(50mL/V)	1瓶	点滴	フラッシュ 15分で	day1
Rp4	5%ブドウ糖注射液(250mL/B) ◆レボホリナート注	1袋 200mg/m ²	点滴	2時間	day1
Rp5	(全量100mLに調整) 生理食塩液(100mL/V) ヘパリンナトリウム注(1万単位/10mL/V) ◆フルオロウラシル注	1瓶 1mL 2400mg/m ²	静脈内局所持 続注入(シユア フューザー)	約46時間 (2mL/H)	day1(~3)

内服

薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日

注意事項

吐き気予防対策:デキサメタゾンの服用 ※ホスネツピタントの代わりにアプレピタント内服を使用することもある

イリノテカンによる相互作用:グレープフルーツジュース禁止(骨髄機能抑制, 下痢等の副作用が増強するおそれあり)

セント・ジョーンズ・ワート禁止(効果低減するおそれあり)

下痢時は乳酸菌を含むヨーグルトなどは避ける